

# UPOZORENJE

## NOVI I OPASNI NEPRIJATELJ PALMI

*Rhynchophorus ferrugineus*

Crveni surlaš palmi



Odrasle jedinke crvenog palminog surlaša

### ŠTA URADITI

POZIVAJU SE SVI DRŽAOCI PALMI DA ISPUNE ZAKONSKU OBAVEZU I UKOLIKO PRIMIJETE POJAVU ILI SUMNJU O PRISUSTVU OVOG ŠTETNOG ORGANIZMA DA ODMAH OBAVIJESTE FITOSANITARNU UPRAVU ILI NADLEŽNOG FITOSANITARNOG INSPEKTORA.

Tel: +382 20 621 111 Fax: +382 20 621 008 E-mail: [fitosanitarnaupravacg@t-com.me](mailto:fitosanitarnaupravacg@t-com.me)

### SIMPTOMI NA PALMAMA



# UPOZORENJE

- CRVENI PALMIN SURLAŠ ŽIVI U UNUTRAŠNJOSTI PALME GDJE ZAVRŠAVA CIJELI ŽIVOTNI CIKLUS
- LARVE SE HRANE U MEKOM TKIVU NAJMLAĐEG LIŠĆA I U UNUTRAŠNJOSTI PALME PRAVEĆI TUNELE I ŠUPLJINE
- SIMPTOMI NAPADA POSTAJU VIDLJIVI TEK KADA JE PALMA GOTOVO UNIŠTENA
- TIPIČAN SIMPTOM NAPADA JE „KLONULOST LISTOVA“ TAKO DA CIJELA BILJKA IZGLEDA KAO KIŠOBRAN
- U NAJVEĆEM BROJU SLUČAJEVA, NE PRELAZI U NOVU PALMU DOK ONA U KOJOJ ŽIVI NIJE POTPUNO UNIŠTENA
- U JEDNOM STABLU PALME ISTOVREMENO SE MOGU NAĆI RAZLIČITI STADIJUMI RAZVIĆA (LARVA, LUTKA U KOKONU, IMAGO)



## SUZBIJANJE

KADA SE UTVRDI PRISUSTVO NAPADNUTIH BILJAKA

NEOPHODNO JE NJIHOVO HITNO UKLANJANJE I MEHANIČKO UNIŠTAVANJE (PALJENJE ILI MLJEVENJE) POD NADZOROM FITOSANITARNE INSPEKCIJE.

## OBAVEZNO PREVENTIVNO TRETIRANJE

PALME KOJE NEMAJU ZNAKOVA PRISUSTVA SURLAŠA TREBA OBAVEZNO PREVENTIVNO TRETIRATI INSEKTICIDIMA (DIMETOAT, HLORPIRIFOS, NEONIKOTINOIDI).

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE OBRATITI SE FITOSANITARNOJ UPRAVI

**Tel: +382 20 621 111 Fax: +382 20 621 008 E-mail: [fitosanitarnaupravacg@t-com.me](mailto:fitosanitarnaupravacg@t-com.me)**

U pripremi letka učestvovali: Prof. dr Snježana Hrnčić; dr Sanja Radonjić; Fitosanitarna uprava Crne Gore; Italijanska Nacionalna Organizacija za zaštitu zdravlja bilja (NPPO)